



ΠΡΟΣΟΧΗ

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν.

Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.

Φοράτε κατάλληλα γάντια και φόρμα εργασίας κατά την ανάμιξη/φόρτωση του προϊόντος και κατά την εφαρμογή με ειδική. Κατά την εφαρμογή με ψεκαστήρα πλήτης, χρησιμοποιείτε κατάλληλα γάντια και φόρμα προστασίας.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:

Τα κενά μέσα συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.

Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω του συστήματος αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, να αφήσετε μίαν ασβέκαστη ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά ύδατα:

- 5 μέτρων σε Ζαχαρότευτλα και Σιτηρά (θερινή εφαρμογή).
- 5 μέτρων, σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 30% σε Μελιτζάνα (Υ), Αγγούρι (Υ), Αγγουράκι (Υ), Κολλοκυθάκι (Υ), Ελαιοκράμβη και Σιτηρά (χειμερινή εφαρμογή).
- 5 μέτρων σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50% σε Πατάτα, Καρότο, Παντζάρι, Λάχανο, Πεπόνι, Φράουλα, Μηδική, Ηλιάνθο, Μπιζέλι (Υ),



Εντομοκτόνο με δράση επαφής και στομάχου στο νευρικό σύστημα των εντόμων. Έχει παράλληλα και ακαρεοκτόνο δράση.

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

Tau-Fluvalinate	24% β/ο
Βοηθητικές ουσίες	76% β/β

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

A.A.D.A.: 14.604/22.03.2017

Αριθμός Παρτίδας:	ΒΛΕΠΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
Ημερομηνία παραγωγής:	

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 1 ΛΙΤΡΟ



Κάτοχος της Άδειας-Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:
ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
 Εθνικής Αντιστάσεως 73,
 15231 Χαλάνδρι
 Τηλ.: 2111205555, Φαξ: 2111205559

Φασόλι (Υ).

- 10 μέτρων σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50% σε Μαρούλι και άλλα σαλατικά.
 - 10 μέτρων σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 90% σε Αμπέλι.
 - 20 μέτρων σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 90% σε Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα, Εσπεριδοειδή και Καλλιπωστικά.
- Για να προστατέψετε τα αρθρώποδα μη-στόχους:
- Χρησιμοποιήστε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 90% στις καλλιέργειες Πυρηνόκαρπων και Μηλοειδών. Αφήστε μίαν ασβέκαστη ζώνη προστασίας:
 - 5 μέτρων σε Αμπέλι, Ανθοκομικά, Φυτώρια, Δασικά και Καλλιπωστικά φυτά και
 - 10 μέτρων σε Κερασιά και Εσπεριδοειδή, από μη γεωργική γη.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Μην προκαλέσετε εμετό.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό. Αν εμφανιστεί ερεθισμός, συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα στα οποία έπεσε σκεύασμα ή ψεκαστικό υγρό. Πλύνετε τα πριν τα ξαναφορέσετε.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2107793777.

ΑΝΑΚΙΝΗΣΤΕ ΤΗ ΦΙΑΛΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

03/Α/2020-12



**ΑΝΟΙΞΤΕ ΕΔΩ
ΓΙΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ**



ΜΑΒΡΙΚ ΑΚΟΥΦΑΛΟΥΣ: Εντομοκτόνο με δράση επαφής και στομάχου στο νευρικό σύστημα των εντόμων. Διαθέτει πολύ καλή αρχική αποτελεσματικότητα και διάρκεια δράσης. Η πλήρης αποτελεσματικότητά του διαπιστώνεται περίπου 3 ημέρες μετά την εφαρμογή και διαρκεί μέχρι 14 ημέρες. Έχει παράλληλα και ακαρεοκτόνο δράση.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμοί καλύψεως φυλλώματος.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση. Προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα του φαρμάκου αναδεύοντας. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού, δύο-τρεις (2-3) φορές με καθαρό νερό.

ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ-ΔΟΣΕΙΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

ΜΗΛΟΕΙΔΗ (Μηλιά-Αχλαδιά-Κυδωνιά-Μουσουλιά): Αφίδες, Δίπτερα: Κηκιδόμυγες, Λεπιδόπτερα: Κορηόφιλα, Φυλλορόυτες, Νάρκες, Φυλλοδέστες, Υπονημοτέλις, Υράντινα, Καφέ Βρωμιάδα, Νεαρές κινητές μορφές κοκκοειδών, Ψύλλοι. Δόση²⁾: 40-120 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής. **ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ (Πορτοκαλιά-Μανταρινιά-Λεμονιά-Γκρέι φρούτ):** Αφίδες, Κοκκοειδή, Λεκάνιο, κ.α., Ακάρια. Δόση: 20-30 κ.εκ./στρ. Ανθερτήρις. Δόση: 40 κ.εκ./στρ. Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής. **ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (Ροδακινιά-Βερκοκιά):** Αφίδες, Θρίπες, Λεπιδόπτερα: Κορηόφιλα, Ανάστρο, Φυλλοδέστες, Δίπτερα: Μύγα Μεσογείου, Καφέ Βρωμιάδα*. Δόση²⁾: 40-120 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής. **ΚΕΡΑΣΙΑ:** Αφίδες, Ραγούλιες, Ρυγχύτιες, Δροσόφιλα*. Δόση: 20-25 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής. **ΑΜΠΕΛΙ (Οινοποιήσιμο & Επιτραπέζιο):** Ευδεδμίδα, Θρίπες, Τζιτζικάκια, Δροσόφιλα*. Δόση²⁾: 30-60 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής. **ΦΡΑΟΥΛΙΑ (Υ):** Θρίπες, Αφίδες, Σποντόπτερα, Δροσόφιλα*. Δόση: 30 κ.εκ./στρ. Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής. **ΠΑΤΑΤΑ:** Δορυφόρος, Αφίδες. Δόση: 30 κ.εκ./στρ. Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής. **ΚΑΡΟΤΟ (Υ)-ΠΑΝΤΖΑΡΙ (Υ):** Αφίδες, Δόση: 30 κ.εκ./στρ. Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής. **ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ (Υ):** Αφίδες, Θρίπες, Πράσινο ακουλήκι, Σποντόπτερα. Δόση: 20 κ.εκ./στρ. Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής. **ΑΓΓΟΥΡΙ (Υ)-ΑΓΓΟΥΡΑΚΙ (Υ)-ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙ (Υ):** Αφίδες, Θρίπες. Δόση: 20 κ.εκ./στρ. Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής. **ΛΕΠΟΝΙ (Υ):** Αφίδες, Θρίπες. Δόση: 30 κ.εκ./στρ. Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής. **ΚΟΝΥΝΟΥΠΙΔΙ (Υ)-ΛΑΧΑΝΟ (Υ)-ΛΑΧΑΝΑΚΙΑ ΒΡΥΞΕΛΩΝ (Υ):** Αφίδες, Θρίπες, Λεπιδόπτερα: Μαμέστρα, Πιερίδα. Δόση: 30 κ.εκ./στρ. Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής. **ΜΑΡΟΥΛΙ (Υ)-ΛΥΚΟΤΡΙΒΟΛΟ (Υ)-ΣΚΑΡΟΛΑ (Μικρίδα) (Υ)-ΚΑΡΔΑΜΟ (Υ)-ΓΑΙΟΚΑΡΔΑΜΟ (Υ)-ΡΟΚΑ (Υ)-ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΙΝΑΠΙ (Υ)-ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΝΕΑΡΩΝ ΦΥΛΜΩ (συμπεριλαμβανομένων ειδών κράμβης) (baby leaf) (Υ):** Αφίδες, Θρίπες, Λεπιδόπτερα: Μαμέστρα, Πιερίδα, Λυριόλυζα. Δόση: 40 κ.εκ./στρ. Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής. **ΜΠΙΖΕΛΙ (Υ)-ΦΑΣΟΛΙΑ (Ιωπά χωρίς ροδό) (Υ):** Αφίδες, Θρίπες, Λεπιδόπτερα: Πυραλίδα, Κάμπια μπιζελιών, Δίπτερα: Κηκιδόμυγα. Δόση: 30 κ.εκ./στρ. Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής. **ΟΣΠΙΡΙΑ (Υ) (Μπιζέλια-Φασόλια-Φακή-Κουκιά-Φάβα/Λαθούρι-Ρεβίθια):** Αφίδες, Δίπτερα: Κηκιδόμυγα, Λεπιδόπτερα: Πράσινο ακουλήκι, Κάμπια μπιζελιών, Θρίπες. Δόση: 30 κ.εκ./στρ. Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής. **ΑΓΓΙΝΑΡΑ (Υ)-ΑΓΡΙΟΑΓΚΙΝΑΡΑ (Υ):** Αφίδες, Θρίπες, Σποντόπτερα. Δόση: 30 κ.εκ./στρ. Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής. **BAMBAKI:** Αφίδες, Θρίπες. Δόση: 20 κ.εκ./στρ. Πράσινο ακουλήκι, Ρόδινο ακουλήκι. Δόση: 30-40 κ.εκ./στρ. Λύγκος, Καφέ Βρωμιάδα*. Δόση: 40 κ.εκ./στρ. Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής. **ΗΛΙΑΝΘΟΣ:** Αφίδες. Δόση: 20 κ.εκ./στρ. Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής. **ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ:** Αφίδες, Σκαθάρι/Κολεόπτερα: Σκαθάρι γύνης, Σκαθάρι στελέχους, Σκαθάρι ραχίνων. Δόση: 20 κ.εκ./στρ. Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής. **ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ:** Αφίδες, Μαμέστρα, Κληονός, Κασσίδα, Άητης. Δόση: 20 κ.εκ./στρ. Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση προνυμφών-προσβολής. **ΣΙΤΑΡΙ-ΚΡΙΘΑΡΙ-ΒΡΩΜΗ-ΣΙΚΑΛΗ:** Αφίδες, Κηκιδόμυγες, *Pentadomidae*, Τζιτζικάκια. Δόση: 20 κ.εκ./στρ. Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής. **ΜΗΔΙΚΗ:** Αφίδες, Σκαθάρι/Κολεόπτερα: Άπιον, Σίτωνα, Φυτονόμος, Λεπιδόπτερα: Κάμπια μπιζελιών, Πυραλίδα. Δόση: 30 κ.εκ./στρ. Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής. **ΑΝΘΟΚΟΜΜΑ-ΚΑΛΛΙΩΠΙΣΤΙΚΑ-ΦΥΤΩΡΙΑ-ΔΑΣΙΚΑ:** Αφίδες, Προνυμφές κοκκοειδών, Θρίπες, Λεπιδόπτερα, Τζιτζικάκια, Κολεόπτερα, Ακάρια. Δόση: 40-80 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής. **ΦΟΙΝΙΚΟΕΙΔΗ:** Κόκκινο σκαθάρι. Δόση: 40-80 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. α) Ψεκασμός κάλυψης από τη στεφάνη για την προστασία των φοινικοειδών από τη προσβολή του εντόμου. β) Ψεκασμός κάλυψης για περιορισμό της εξάπλωσης της προσβολής στο κομμένο φυτό, στα κομμένα τεμάχια και στο χώρο γύρω από τη θέση κοπής, κατά τη διαδικασία της κοπής. γ) Στο χώρο διατήρησης των υπεθών φυτών (φυτώρια): σε περίπτωση που υπάρχουν ύποπτα σημεία προσβολής στο χώρο ή στη γύρω περιοχή, προληπτική εφαρμογή με ψεκασμό κάλυψης των φυτών (όσα φυτώρια τα φοινικοειδή έχουν μικρό ύψος και μπορεί να γίνει ψεκασμός κάλυψης).

Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα): Εσπεριδοειδή (150-250), Μηλοειδή-Πυρηνόκαρπα (50-150), Κερασιά (100), Αμπέλι (οινοποιήσιμο & επιτραπέζιο)-Πατάτα-Αγγούρι (Υ)-Αγγουράκι (Υ)-Κολοκυθάκι (Υ)-Πεπόνι (Υ)-Μπιζέλι (Υ)-Φασόλια (Ιωπά χωρίς ροδό) (Υ)-Γοσπρία: Μπιζέλια-Φασόλια-Φακή-Κουκιά-Φάβα (λαθούρι)-Ρεβίθια (Υ)-Ανθοκομικά-Καλλιωπιστικά-Φυτώρια-Δασικά-

φοινικοειδή (50-100), Φράουλα (Υ)-Μηδική (20-100), Καρότο (Υ)-Παντζάρι (Υ)-Ηλίανθος (15-40), Μελιτζάνα (Υ) (15-50), Κουνουπίδι (Υ)-Λάχανο (Υ)-Λαχανάκια Βρυξελλών (Υ) (10-50), Μαρούλι (Υ)-Λυκοτριβόλο (Υ)-Σκαρόλα (μικρίδα) (Υ)-Κάρδαμο (Υ)-Γαιοκάρδαμο (Υ)-Ρόκα (Υ)-Κόκκινο Σιναπί (Υ)-Καλλιέργειες νεαρών φυλλών (συμπεριλαμβανομένων ειδών κράμβης) (baby leaf) (Υ) (30-50), Αγκινάρα (Υ)-Αγριοαγκινάρα (Υ)-Ελαιοκράμβη-Σιτάρι-Κριθάρι-Βρώμη-Σίκαλη (10-40), Βαμβάκι (50), Ζαχαρούτευτλα (20-40).

Μείνουμε αριθμός εφαρμογών ανά καλλιερπητική περίοδο:

Σιτάρι-Κριθάρι-Βρώμη-Σίκαλη: Τρεις (3) εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10 ημερών εφόσον απαιτείται. Μηλοειδή, Εσπεριδοειδή, Πυρηνόκαρπα, Κερασιά, Αμπέλι (οινοποιήσιμο & επιτραπέζιο), Φράουλα (Υ), Πατάτα, Καρότο (Υ), Παντζάρι (Υ), Μελιτζάνα (Υ), Αγγούρι (Υ), Αγγουράκι (Υ), Κολοκυθάκι (Υ), Πεπόνι (Υ), Μαρούλι (Υ), Λυκοτριβόλο (Υ), Σκαρόλα/μικρίδα (Υ), Κάρδαμο (Υ), Γαιοκάρδαμο (Υ), Ρόκα (Υ), Κόκκινο Σιναπί (Υ), Καλλιέργειες νεαρών φυλλών (συμπεριλαμβανομένων ειδών κράμβης) (baby leaf) (Υ), Μπιζέλι (Υ), Φασόλια/Ιωπά χωρίς ροδό (Υ), Γοσπρία (Υ) ΙΜπιζέλια, Φασόλια, Φακή, Κουκιά, Φάβα (λαθούρι), Ρεβίθια, Αγκινάρα (Υ), Αγριοαγκινάρα (Υ), Βαμβάκι, Ηλίανθος, Ελαιοκράμβη, Ζαχαρούτευτλα, Μηδική, Ανθοκομικά, Καλλιωπιστικά, Φυτώρια, Δασικά: Δύο (2) εφαρμογές με μεσοδιάστημα 14 ημερών εφόσον απαιτείται. / Φοινικοειδή: Δύο (2) εφαρμογές. / Κουνουπίδι (Υ), Λάχανο (Υ), Λαχανάκια Βρυξελλών (Υ): Μία (1) εφαρμογή.

Παρατηρήσεις: 1) Έχει δειτερεύουσα δράση στις κινητές μορφές τετρανύων. **2)** Στα μηλοειδή, πυρηνόκαρπα και αμπέλι, η δόση κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού να συνδυάζεται κατάλληλα με τον όγκο του ψεκαστικού υγρού ώστε να μην ξεπερνιέται η μέγιστη δόση ανά στρέμμα. **3)** Ειδικά στα φοινικοειδή: α) Η χρήση του σκευάσματος θα διενεργείται αποκλειστικά στα πλαίσια εφαρμογής της Απόφασης 2007/365/ΕΚ της Επιτροπής, όπως ισχύει. Αρμόδιες Υπηρεσίες για την εφαρμογή της εν λόγω Απόφασης είναι οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των οικείων Περιφερειακών Ενотήτων, β) Οι ΔΑΟΚ, οι Δήμοι και οι υπεύθυνοι των συλλεγών θα διενεργούν τους ψεκασμούς, υποχρεούνται να ειδοποιούν έγκαιρα τους μελισσοκόμους της περιοχής τους προκειμένου να διενεργηθεί εφαρμογή του σκευάσματος σε φοινικοειδή, με κάθε πρόφρονό μέσο, γ) Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και μέχρις ότου στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό, να μην εισέρχονται άνθρωποι και κατοικίδια ζώα στην ψεκαζόμενη περιοχή, δ) Σε περίπτωση που απαιτείται χρήση φερονικικών παγίδων, αυτή να γίνεται μόνο με το συντονισμό των αρμοδίων τοπικών αρχών. ***Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα στη καφέ βρωμιάδα της ροδακινιάς, της βερκοκιάς και του βαμβάκιου και στη Δροσόφιλα της κερασιάς, της φράουλας και του αμπελιού. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος δεν φέρει ευθύνη για πιθανές απουσίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα από την εφαρμογή του σκευάσματος.**

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: Χρήση καλλιερπητικών τεχνικών και φυσικών και βιολογικών μεθόδων ώστε να περιοριστεί ο πληθυσμός των εντόμων και να μειώνεται ο αριθμός των εφαρμογών στις αποψήτως απαραίτητες για αποτελεσματικό έλεγχο. Να εφαρμόζεται σε εναλλαγή με εντομοκτόνα άλλων ομάδων με διαφορετικό τρόπο δράσης.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ ΟΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΘΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ:

Μην εισέρχεστε στον αγρό πριν να έχει στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό. Μην εκτελείτε χειρωνακτικές εργασίες στις ψεκασμένες καλλιέργειες πριν την πάροδο δύο ημερών από τον τελευταίο ψεκασμό. Μετά την πάροδο δύο ημερών, μπορείτε να εκτελέσετε χειρωνακτικές εργασίες φορώντας γάντια.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΙΜΕΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:

Ηλίανθος: 60 ημέρες.
Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα, Εσπεριδοειδή, Σιτάρι (όπως αναφέρονται στο φάσμα δράσης), Ελαιοκράμβη: 30 ημέρες.
Αμπέλι (οινοποιήσιμο και επιτραπέζιο): 21 ημέρες.
Πατάτα, Καρότο (Υ), Παντζάρι (Υ), Μαρούλι και λοιπά σαλατικά (Υ), Γοσπρία (Υ) ΙΜπιζέλια, Φασόλια, Φακή, Κουκιά, Φάβα (λαθούρι), Ρεβίθια, Ζαχαρούτευτλα: 14 ημέρες.
Κερασιά: 10 ημέρες.
Αγγούρι (Υ), Αγγουράκι (Υ), Κολοκυθάκι (Υ), Φράουλα (Υ), Πεπόνι (Υ), Κουνουπίδι (Υ), Λάχανο (Υ), Λαχανάκια Βρυξελλών (Υ), Μπιζέλι (Υ), Φασόλια (Ιωπά, χωρίς ροδό) (Υ), Αγκινάρα (Υ), Αγριοαγκινάρα (Υ), Βαμβάκι, Μηδική: 7 ημέρες.
Μελιτζάνα (Υ): 3 ημέρες.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:

Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις συνιστώμενες χρήσεις, δόσεις και οδηγίες εφαρμογής.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:

Διατηρείται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε χώρο δροσερό και καλά αεριζόμενο, προστατευμένο από τον παγετό σε θερμοκρασίες <40° C. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.