

SUPPORT

97,6EC

ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙΜΟ
ΥΓΡΟ (EC)


Εντομοκτόνο-ακαρεοκτόνο επαφής με δράση σε όλα τα στάδια: ακμιαία, κινητές μορφές και αυγά

Καλλιέργεια, στόχος και δόσολογία: **ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ** (Λεμονιά, Μανταρινιά (Κλημεντίνες), Πορτοκαλιά): για την καταπολέμηση α) της Κόκκινης Ψώρας, της παραλτόριας και άλλων ψωρών. Εφαρμογές πριν την αλλαγή χρώματος των καρπών με δόση 1000-1500 κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (1000-2240 κ.εκ./ στρ.) με όγκο ψεκαστικού υγρού 100-220 λίτρα/στρέμμα και β) των Αλευροδών (*Dialeurodes citri*, *Aleurothrix floccosus*). Εφαρμογή πριν την αλλαγή χρώματος των καρπών ή μία φθινοπωρινή με δόση 1000-1500 κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (500-2240κ.εκ./ στρ.) με όγκο ψεκαστικού υγρού 50-220 λίτρα/στρέμμα. **ΜΗΛΟΕΙΔΗ (Μηλιά, Αχλαδιά):** για την καταπολέμηση α) της Ψώρας Σαν-Ζοζέ και άλλων ψωρών. Εφαρμογή πριν την αλλαγή χρώματος των καρπών με δόση 750-1000 κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (600-1000κ.εκ./ στρ.) με όγκο ψεκαστικού υγρού 80-100 λίτρα/στρέμμα και β) του κόκκινου τετράνυχου. Εφαρμογή πριν την άνθηση με δόση 750-1000 κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (940-1500κ.εκ./ στρ.) με όγκο ψεκαστικού υγρού 80-100 λίτρα/στρέμμα και β) του κόκκινου και κίτρινου τετράνυχου. Εφαρμογή πριν την άνθηση με δόση 750-1000 κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (940-1250κ.εκ./ στρ.) με όγκο ψεκαστικού υγρού 125 λίτρα/στρέμμα. **Χρήσεις ήσσονος σημασίας: Ελιά:** Μία εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής, από την πτώση των πετάλων ως μικρούς καρπούς για καταπολέμηση των εχθρών Παρλατόρια, λεκάνιο, πολλίνα, άσπη ψώρα, μυτιλόμορφη ψώρα, ψώρες (*Leucaspis riccae*), (*Chrysomphalus dictyospermi*), ακάρεα (*Eriophyes vitis*), (*Tegolophus hassani*), (*Oxycenus maxwelli*) (*Eotetranychus carpini*). **Δόση 750-1000 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (600-1500 κ.εκ./στρ.)** με όγκο ψεκαστικού υγρού 80-150 λίτρα/στρ. **Ακτινιδιά:** Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής, πριν την άνθηση και μετά τη συγκομιδή για καταπολέμηση των εχθρών: Ψώρα Σαν Ζοζέ, βαμβάκαδα ή διάστις (*Pseudaulacaspis pentagona*), Μετκάλα, Βαμβάκαδα (*Eurphyllura* sp.), Κίτρινος Τετράνυχος, Κόκκινος Τετράνυχος. **Δόση 750-1000 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (600-1500 κ.εκ./στρ.)** με όγκο ψεκαστικού υγρού 80-150 λίτρα/στρ. **Μέγ. αριθμός εφαρμ/ ανά καλλ. περίοδο:** 1-2 με ελάχιστο μεσοδιάστημα 60 ημερών για εσπεριδοειδή, 2 για την ακτινιδιά, 1 για όλες τις υπόλοιπες καλλιέργειες. **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:** 1. Το εύρος των δόσεων και ο όγκος ψεκαστικού υγρού είναι ανάλογα με το ύψος των φυτών και την ένταση της προσβολής. 2. Στα εσπεριδοειδή η συνιστώμενη δόση θα πρέπει να συνδυαστεί με τον κατάλληλο όγκο ψεκαστικού υγρού ώστε να μην υπερβαίνεται η μέγιστη δόση/στρ. 3. Κατά τη χρήση του SUPPORT 97,6 EC τα δένδρα πρέπει να είναι ποτισμένα. Ποτίζουμε μία εβδομάδα πριν από τον ψεκασμό. 4. Αποφύγετε τον ψεκασμό όταν τα φυτά είναι μισομαραμένα, σε περιόδους έντονης ξηρασίας, υπερβολικής υγρασίας και όταν υπάρχει παγετός. 5. Να μην γίνεται εφαρμογή με το σκεύασμα, την περίοδο της ανθοφορίας ή όταν η θερμοκρασία ξεπερνάει τους 32°C γιατί μπορεί να εμφανιστούν προβλήματα φυτοτοξικότητας. 6. Να μη γίνεται εφαρμογή με το σκεύασμα επί 30 ημέρες πριν ή μετά την εφαρμογή θείου ή θειασβεστίου. 7. Να μην προηγείται ή έπεται εφαρμογή σκευασμάτων με δ.ο. carptan, folpet και dithianon σε διάστημα τουλάχιστον 1 εβδομάδας. 8. Για τις χρήσεις ήσσονος σημασίας: Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες Ελιά και Ακτινιδιά από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος». **Τρόπος εφαρμογής:** Ψεκασμοί φυλλώματος. **Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέστε την συνιστώμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση μέχρι το τέλος του ψεκασμού. **Καθαρισμός ψεκαστήρα:** Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού δύο (2) φορές με καθαρό νερό. **Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:** Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυνματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρίτημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, να αναποστειθούν σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. **Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:** Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό στα φυτά (24 ώρες). **Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:** Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις συνιστώμενες χρήσεις, δόσεις και προφυλάξεις. **Προστασία των καταναλωτών- Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:** Καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του σκευάσματος. **Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:** Διατηρείται στην αρχική του απαραβαία συσκευασία, σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος, σε θερμοκρασία > 0°C . Σε αυτές τις συνθήκες διατηρείται σταθερό για 2 χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής του.

Εγγυημένη σύνθεση: Paraffin oil (Παραφινέλαιο) 83% β/ο ή 97,6% β/β, Βοηθητικές ουσίες 2,4% β/β

ΑΑΔΑ: 14488/26.08.14

ΒΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ



ΚΙΝΔΥΝΟΣ. Μπορεί να προκαλέσει θάνατο περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς. Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία: -Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. -Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείται αυτό το προϊόν. -Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφυλάξης. «Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης» **Πρώτες βοήθειες:** Σε περίπτωση κατάποσης καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Σε περίπτωση εσποφής με τα μάτια: Πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό. Εάν μετά το πλύσιμο ο ερεθισμός επιμένει, ζητείστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείτε συμπτωματική θεραπεία. **Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777**

Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/ Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω του συστήματος αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αφέκαστη ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά ύδατα: -10 μέτρων σε Εσπεριδοειδή και σε όψιμες εφαρμογές σε Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα, Ελιά και Ακτινιδιά. -20 μέτρων σε πρώιμες εφαρμογές σε Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα, Ελιά και Ακτινιδιά

Κάτοχος της άδειας: W. NEUDORFF GmbH KG,
An der Mühle 3, T.K : D-31860 Emmertal – Γερμανία
Υπεύθυνος για τη διάθεση
στην αγορά:

κελλαφαρμ
Α.Ε.

1^ο χλμ. Λ. Παϊνίας-Μαρκοπούλου, Τ.Θ. 100,19002, Παϊνία,
Τηλ.: 210.68.00.900, info@hellafarm.gr, www.hellafarm.gr

Ημ. παρασκευής, Ημερ. λήξης, Αρ. Παρτίδας: Βλέπε άνω μέρος φιάλης

1910 Περιεχόμενο: 10 ΛΙΤΡΑ